

CYPRESS

INSETICIDA

Concentrado para emulsão (EC) com 500 g/L ou 47,46% (p/p) de cipermetrina

Contém solvente nafta (petróleo) aromática leve

CYPRESS é um inseticida piretróide, de contacto e ingestão. Atua no sistema nervoso, como modulador dos canais de sódio.

IRAC MoA Grupo 3A.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO

Autorização de Venda Nº 1635, concedida pela DGAV

Capacidade da embalagem: 100mL e 1L

Um produto:

Arysta LifeScience Benelux sprl.

Rue de Renory 26/1

B-4102 Ougrée – Bélgica

Tel.: +32 4 385 97 11

Fax: +32 4 385 97 49

Distribuído por:

IQV Agro Portugal S.A.

R. Dr. Hilário Barreiro Nunes, Lt

49

Zona Industrial de Santarém

2005-002 Várzea Santarém

Tel. 253 217 304

iqvportugal@iqvagro.com

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Cultura	Problema	Concentração/ Dose	Aplicações	I.S.
Melancia, meloeiro e abóbora	Afídeos (Aphis spp. e Myzus spp.), nóctuas (Agrotis segetum), lagartas-de-lepidópteros (Autographa sp. e Spodoptera littoralis), lagarta-do-tomate (Helicoverpa armígera), mosca-branca-das-estufas (Trialeurodes vaporariorum) e tripes (Thrips sp.)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	3 dias
Alho	Nóctuas (Agrotis segetum), lagartas-de-lepidópteros (Autographa sp. e Spodoptera littoralis), traça da cebola (Acrolepiopsis assectella) e tripes (Thrips sp.)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	3 dias
Cebola e chalota	Afídeos (Aphis spp. e Myzus spp.), nóctuas (Agrotis segetum), lagartas-de-lepidópteros (Autographa sp. e Spodoptera littoralis), traça da cebola (Acrolepiopsis assectella) e tripes (Thrips sp.)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	3 dias
Aveia, centeio, cevada, espelta, trigo e triticales	Afídeos-vectores-de-BYDV (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae e Metopolophium dirhodum), afídeo-negro-da-faveira (Aphis fabae), afídeos (Diuraphis noxia e Schizaphis graminum), afídeo-verde (Myzus persicae), larva-lesma (Oulema sp) e nóctuas (Agrotis segetum)	50 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 15 dias.	28 dias
Batateira	Afídeos (Aphis spp. e Myzus spp.), escaravelho-da-batateira (Leptinotarsa decemlineata) e traça-da-batateira (Phthorimaea operculella)	80-100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	3 dias

Tomateiro e beringela	Afídeos (Aphis spp. e Myzus spp.), mosca-branca-das-estufas (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), nóctuas (<i>Agrotis segetum</i>), lagartas-de-lepidópteros (<i>Autographa</i> sp. e <i>Spodoptera littoralis</i>), lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>), tripe-da-Califórnia (<i>Frankliniella occidentalis</i>) e tripes (<i>Thrips</i> sp.)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	3 dias
Cenoura, cercefi, pastinaca, rábano e rabanete	Afídeos (Aphis spp. e Myzus spp.), nóctuas (<i>Agrotis segetum</i>) e lagartas-de-lepidópteros (<i>Autographa</i> sp. e <i>Spodoptera littoralis</i>)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	3 dias
Salsa de salsa	Afídeos (Aphis spp. e Myzus spp.), nóctuas (<i>Agrotis segetum</i>), lagartas-de-lepidópteros (<i>Autographa</i> sp. e <i>Spodoptera littoralis</i>) e tripes (<i>Thrips</i> sp.)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	3 dias
Couve-brócolo, couve-flor e couves-de-repolho	Afídeos (Aphis spp. e Myzus spp.), áltica (<i>Phyllotreta</i> spp.), nóctuas (<i>Agrotis segetum</i>), lagartas-de-lepidópteros (<i>Autographa</i> sp., <i>Pieris</i> sp. e <i>Spodoptera littoralis</i>), lagarta-do-tomate (<i>Helicoverpa armigera</i>), nóctua-da-couve (<i>Mamestra brassicae</i>), traça-da-couve (<i>Plutella xylostella</i>) e tripes (<i>Thrips</i> sp.)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	3 dias
Ervilheira	Afídeos (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis craccivora</i>), afídeo-negro-da-faveira (<i>Aphis fabae</i>), afídeo-verde (<i>Myzus persicae</i>), nóctuas (<i>Agrotis segetum</i>), lagartas-de-lepidópteros (<i>Autographa</i> sp. e <i>Spodoptera littoralis</i>), tripe-da-Califórnia (<i>Frankliniella occidentalis</i>) e tripes (<i>Thrips tabaci</i> e <i>Thrips augusticeps</i>)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	3 dias

Feijoeiro	Afídeos (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis craccivora</i>), afídeo-negro-da-faveira (<i>Aphis fabae</i>), afídeo-verde (<i>Myzus persicae</i>), nóctuas (<i>Agrotis segetum</i>), lagartas-de-lepidópteros (<i>Spodoptera littoralis</i>), tripe-da-Califórnia (<i>Frankliniella occidentalis</i>) e tripes (<i>Thrips tabaci</i>)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	3 dias
Milho forrageiro e milho para grão	Broca-do-milho (<i>Ostrinia nubilalis</i>) e nóctuas (<i>Agrotis segetum</i>)	150 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	3 dias
Oliveira (jovens árvores até 3 anos, não tendo ainda entrado em produção)	Mosca-da-azeitona (<i>Bactrocera oleae</i>), traça-da-oliveira (<i>Prays oleae</i>) (geração antófaga e carpófaga) e traça-verde-da-oliveira (<i>Palpita unionalis</i>)	8-10 ml/hl, não excedendo a dose de 100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	
Videira (uvas de mesa e uvas para vinificação)	Charuteiro (<i>Byctiscus betulae</i>), cicadela-da-vinha (<i>Scaphoideus titanus</i>), cigarrinha verde (<i>Empoasca vitis</i>), piral-da-vinha (<i>Sparganothis pilleriana</i>) e traça-dos-cachos (<i>Eupoecilia ambiguella</i> e <i>Lobesia botrana</i>)	60 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 1 aplicação.	21 dias
Alcachofra	Afídeo-negro-da-faveira (<i>Aphis fabae</i>), afídeo (<i>Myzus persicae</i>) e nóctuas-da-alcachofra (<i>Gortyna xanthenes</i> e <i>Gortyna flavago</i>)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias	3 dias
Beterraba-sacarina	Afídeos (<i>Aphis</i> spp. e <i>Myzus</i> spp.), cássida (<i>Cassida vittata</i>), cleonus (<i>Conorhynchus mendicus</i>), nóctuas (<i>Agrotis segetum</i>) e lixus (<i>Lixus juncii</i>)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias	14 dias

Beterraba-forrageira e beterraba-de-mesa	Afídeos (Aphis spp. e Myzus spp.), cássida (Cassida vittata), cleonius (Conorhynchus mendicus), nóctuas (Agrotis segetum), lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis) e lixus (Lixus juncii)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias	14 dias
Rutabaga (couve-nabo) e nabo	Afídeos (Aphis spp. e Myzus spp.), nóctuas (Agrotis segetum) e lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	14 dias
Choupo (em viveiro e em plantações jovens)	Afídeos (Aphis spp. e Myzus spp.) e gorgulho do choupo (Cryptorhynchus lapathi)	10 ml/hl, não excedendo a dose de 100 ml/ha por aplicação	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	
Colza de inverno e primavera e mostarda	Áltica-da-couve (Psylliodes chrysocephala)	50 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 15 dias.	21 dias
Espargo	Escaravelho-do-espargo (Crioceris asparagi)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga apenas após a colheita. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	3 dias
Luzerna	Afídeos (Aphis spp. e Myzus spp.), nóctuas (Agrotis segetum) e lagartas-de-lepidópteros (Spodoptera littoralis)	100 ml/ha	Aplicar ao aparecimento da praga apenas após a colheita. Realizar no máximo 2 aplicações	7 dias

Tabaco			com intervalo mínimo de 10 dias.	14 dias
Florestais em viveiro	Limântria (<i>Lymantria dispar</i>)	Aplicar na concentração de 4 ml/hl, não excedendo a dose de 100 ml/ha por aplicação.	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	
Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou fruto (de corte e/ou em vaso)	Afídeos (<i>Aphis</i> spp., <i>Aulacorthum</i> sp., <i>Macrosiphum</i> sp. e <i>Myzus</i> spp.), nóctuas (<i>Agrotis segetum</i>), lagartas-de-lepidópteros (<i>Spodoptera littoralis</i>), lagarta-dos-craveiros (<i>Cacoecimorpha pronubana</i>), mosca-branca (<i>Bemisia tabaci</i>) mosca-branca-das-estufas (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), mineira-das-folhas (<i>Liriomyza bryoniae</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i> e <i>Liriomyza trifolii</i>) e tripses (<i>Thrips</i> sp.)	Aplicar na concentração de 10-20 ml/hl, não excedendo a dose de 100 ml/ha por aplicação.	Aplicar ao aparecimento da praga. Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 10 dias.	
À exceção das espécies florestais em viveiro e plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou fruto (de corte e/ou em vaso), para todas as outras culturas, ainda que passíveis de cultivo em ambiente protegido, o produto deve ser sempre utilizado ao ar livre.				

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o aparecimento de fenómenos de resistência, alternar os tratamentos com produtos com diferente modo de ação ou pertencentes a diferentes grupos químicos de resistência.

CYPRESS não é compatível com produtos fitossanitários de reação fortemente alcalina.

Realizar a aplicação na ausência de vento.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA:

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO:

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

Não aplicar por meios aéreos.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS:

Rotulagem conforme o regulamento (CE) No. 1272/2008 [CRE/GHS]:

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal: PERIGO

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H302+H332 Nocivo por ingestão ou inalação.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315 Provoca irritação cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

H373 Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P260 Não respirar a nuvem de pulverização.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 Usar luvas de protecção, vestuário de protecção, protecção ocular e protecção facial.

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível.

Continuar a enxaguar.

P331 NÃO provocar o vómito.

P391 Recolher o produto derramado.

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

SPe3PT2 Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada, em relação às águas de superfície, de: 5 metros em aveia, centeio, cevada, colza, espelta, mostarda, trigo e tritcale; 10 metros ou 5 metros com bicos anti-deriva que permitam uma redução do arrastamento em 50%, em batateira, beterraba forrageira, hortícolas, luzerna, ornamentais de altura inferior a 50 cm e tabaco; 15 metros ou 5 metros com bicos anti-deriva que permitam uma redução do arrastamento em 50% em milho; 30 metros em choupo; 30 metros ou 5 metros com bicos anti-deriva que permitam uma redução do arrastamento em

50% em videira; 30 metros ou 20 metros com bicos anti-deriva que permitam uma redução do arrastamento em 50% em oliveira.

S_{Pe}8 Perigoso para as abelhas. Para protecção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto no período de presença das abelhas. Não aplicar na época de floração das culturas.

S_{Po}PT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar, luvas, camisa de mangas compridas,

calças, meias e botas.

S_{Po}PT4 O aplicador deverá usar: luvas de protecção, vestuário de protecção, protecção ocular, protecção facial e

máscara respiratória durante a preparação da calda e aplicação do produto.

S_{Po}PT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do

pulverizado.

S_{Po}PT6 Após o tratamento lavar bem o material de protecção e os objetos contaminados, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti Venenos,

Telef: 800 250 250



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Armazenamento: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na Lei.